



Tabakkonsum in Deutschland


Aktuelle Ergebnisse der Gesundheitssurveys des Robert Koch-Instituts

Thomas Lampert






Gesundheitssurveys des RKI 1984-2006





Rauchquoten in verschiedenen Altersgruppen


Datenbasis: Telefonischer Gesundheitssurvey 2006





Rauchquoten nach sozialem Status

Datenbasis: Telefonischer Gesundheitssurvey 2006



OR [95%-KI] = 1,73 [1,37-2,17]

OR [95%-KI] = 1,65 [1,26-2,17]



Bevölkerungsgruppenspezifische Unterschiede im Rauchen

Datenbasis: Telefonischer Gesundheitssurvey 2006

**Ergebnisse binär logistischer Regressionen bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Einflussgrößen:
Altersadjustierte Odds Ratio**

	Männer	Frauen
Schulbildung		
Volks-/Hauptschule	1,36*	2,21***
Mittlere Reife	1,28*	1,58**
Abitur	Ref.	Ref.
Berufsstatus		
Niedrig	1,72**	0,87
Mittel	1,75**	0,75
Gehoben	1,17	0,87
Hoch	Ref.	Ref.
Einkommen		
Sehr niedrig	0,91	1,16
Niedrig	0,79	0,93
Mittel	0,75	0,92
Hoch	Ref.	Ref.

	Männer	Frauen
Arbeitslosigkeit		
Ja	1,99***	1,50*
Nein	Ref.	Ref.
Lebensform		
Alleinlebend	1,41*	1,33**
Alleinerziehend		2,98***
Partner (ohne Kinder)	1,11	1,05
Partner (mit Kinder)	Ref.	Ref.
Wohnregion		
Ost	0,92	0,79*
West	Ref.	Ref.


Signifikanz: * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,01

Ref.: Referenzgruppe



Entwicklung der Rauchquoten seit Mitte der 1980er Jahre in der 25- bis 69-jährigen Bevölkerung


Datenbasis: Gesundheitssurveys des RKI 1984-2006





Entwicklung der Rauchquoten in den Jahren 2003 bis 2006 in verschiedenen Altersgruppen


Datenbasis: Telefonische Gesundheitssurveys 2003 und 2006





Entwicklung der Rauchquoten in den Jahren 2003 bis 2006 nach sozialem Status (nur 18- bis 29-Jährige)

Datenbasis: Telefonische Gesundheitssurveys 2003 und 2006





Entwicklung der Rauchquoten in den Jahren 2003 bis 2006 nach Wohnregion (nur 18- bis 29-Jährige)

Datenbasis: Telefonische Gesundheitssurveys 2003 und 2006

