

EL TABAQUISMO EN COLOMBIA

MUERTE, ENFERMEDAD Y SITUACIÓN IMPOSITIVA

88 PERSONAS MUEREN POR DÍA

en Colombia a causa del tabaquismo.

4,7 BILLONES DE PESOS COLOMBIANOS SON GASTADOS CADA AÑO

para tratar problemas de salud provocados por el tabaco.


MUERTES ANUALES ATRIBUIBLES AL TABAQUISMO

La información que aquí se muestra forma parte de una investigación colaborativa coordinada por el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Economía de la Salud del IECS y realizada por un equipo de más de 40 investigadores y decisores sanitarios de universidades, centros de investigación e instituciones públicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Se utilizó un modelo matemático para estimar las probabilidades que tienen las personas de enfermar o morir por cada una de las condiciones asociadas con el tabaquismo. Los datos corresponden a 2015, y a personas mayores de 35 años.



16,1%

DE TODAS LAS MUERTES QUE SE PRODUCEN EN EL PAÍS PUEDEN SER ATRIBUIDAS AL TABAQUISMO



32.088

MUERTES POR AÑO QUE PODRÍAN EVITARSE



\$4.685.630.926.140



ES EL COSTO DIRECTO

EN EL SISTEMA DE SALUD ATRIBUIBLE AL TABAQUISMO
(\$ = peso colombiano)

PERSONAS QUE ANUALMENTE ENFERMAN POR MOTIVOS ATRIBUIBLES AL TABACO




EN EL TOTAL DE LA POBLACIÓN:
**CADA AÑO
SE PIERDEN**

**789.587
AÑOS DE VIDA**


POR MUERTE PREMATURA
Y DISCAPACIDAD

CONSECUENCIAS DE FUMAR


Años de vida perdidos por persona



COSTOS DE ATENCIÓN ASOCIADOS CON EL TABAQUISMO



En Colombia, la recaudación impositiva por la venta de cigarrillos (\$477 mil millones anuales) cubre apenas el 10% de los gastos directos que el cigarrillo provoca en el sistema de salud.



Gastos en el Sistema de Salud provocados por el cigarrillo



El aumento de los impuestos está reconocido en todo el mundo como una de las medidas más importantes que los países deberían implementar para combatir el tabaquismo.

El precio de los cigarrillos en Latinoamérica es extraordinariamente bajo en comparación con otras regiones del mundo. Esto facilita el acceso al tabaco, especialmente entre los jóvenes.

¿QUÉ OCURRIRÍA SI COLOMBIA AUMENTARA UN 50% EL PRECIO DE LOS CIGARRILLOS?

Se estaría implementando
**UNA DE LAS MEDIDAS MÁS EFECTIVAS
PARA CONTROLAR EL CONSUMO DE TABACO**

EN 10 AÑOS PODRÍAN EVITARSE:



45.049
MUERTES



142.162
INFARTOS
Y EVENTOS
CARDÍACOS



62.967
ACCIDENTES
CEREBRO-
VASCULARES




17.401
NUEVOS
CÁNCERES




1.173.703
AÑOS DE VIDA
PERDIDOS POR
MUERTE
Y DISCAPACIDAD

ADEMAS SE OBTENDRÍAN BENEFICIOS ECONÓMICOS

\$8 BILLONES
(PESOS COLOMBIANOS)
**EN LOS PRÓXIMOS
10 AÑOS.**



\$7 BILLONES
POR AHORRO
EN COSTOS SANITARIOS




\$1 BILLÓN
POR RECAUDACIÓN
IMPOSITIVA ADICIONAL




¿QUÉ OCURRIRÍA SI COLOMBIA AUMENTARA EL PRECIO DE LOS CIGARRILLOS?

MUERTES QUE PODRÍAN EVITARSE



COSTOS EN ATENCIÓN SANITARIA QUE PODRÍAN EVITARSE



IMPACTO DEL AUMENTO DE IMPUESTOS AL TABACO SOBRE LAS MUERTES Y ENFERMEDAD ATRIBUIBLES EN COLOMBIA.

El tabaquismo es la principal causa prevenible de muerte y enfermedad a nivel mundial. Cada año, más de cinco millones de muertes en el mundo son atribuibles al consumo de productos del tabaco y se espera que para el 2025 la cantidad de decesos anuales alcance los 10 millones. En Colombia, se estima que el 7,3 a 13% por ciento de las mujeres y el 18,5 a 22% de los hombres son fumadores.

La información que aquí se muestra forma parte de una investigación en la que colaboraron **más de 40 investigadores y decisores sanitarios de universidades, centros de investigación e instituciones públicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay.** Los resultados se obtuvieron utilizando un modelo matemático desarrollado por el grupo de investigación⁽¹⁾ que permite estimar las probabilidades que tienen las personas de enfermar o morir a causa de cada una de las principales condiciones asociadas al tabaquismo.

En **Colombia** el tabaquismo ocasiona una importante cantidad de muertes, enfermedades y costos sanitarios. El mayor peso está dado por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las enfermedades cardíacas, y cánceres. El impacto del tabaquismo en la mortalidad y en la calidad de vida es responsable en forma directa de la pérdida de 789.587 años de vida cada año y explica el 16,1% de todas las muertes que se producen en el país en mayores de 35 años. Esto representa 32.088 muertes por año que podrían ser evitadas, que representan el 29% del total de muertes por patologías asociadas al tabaquismo en un año en Colombia.

El tabaquismo genera además un costo directo anual de \$4,685 billones (pesos colombianos), lo que equivale al 0,59% de todo el producto bruto interno (PBI) del país y al 8,14% de todo el gasto público en salud anual. La recaudación impositiva por la venta de cigarrillos es de alrededor de \$477 mil millones anuales, un valor que apenas llega a cubrir el 10% de los gastos directos provocados por el cigarrillo en el sistema de salud. El aumento del precio de los cigarrillos a través de

impuestos es reconocido en el mundo como la medida más costo-efectiva para reducir su consumo, sobre todo cuando se logran políticas fiscales sostenidas en el tiempo.

Como puede observarse en los resultados de esta investigación, con un incremento en el precio de los cigarrillos en Colombia podrían lograrse enormes beneficios para toda la población. Un aumento del 50% podría llegar a evitar 45.049 muertes, 142.162 enfermedades cardíacas, 17.401 nuevos cánceres y eliminar 62.967 accidentes cerebrovasculares (ACV) en diez años. Además, se podrían generar recursos por \$8 millones, cifra derivada del ahorro en gastos sanitarios y del aumento en la recaudación impositiva.⁽²⁾

El equipo de profesionales que realizó esta investigación espera que los resultados de este trabajo ayuden a aumentar la conciencia sobre el impacto sanitario y económico del tabaquismo y constituyan una herramienta útil para que los gobiernos y sistemas de salud puedan definir medidas más efectivas y eficientes en la lucha contra el tabaquismo.

Financiamiento: Este trabajo se realizó con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá – IDRC.⁽³⁾

(1) Pichon-Riviere A, Augustovski F, Bardach A, Colantonio L. for the LatinCLEN Tobacco Research Group. *Development and Validation of a Microsimulation Economic Model to Evaluate the Disease Burden Associated with Smoking and the Cost-Effectiveness of Tobacco Control Interventions in Latin America.* *ValueHealth.* 2011 Jul-Aug;14(5 Suppl 1):S1-9.

(2) Pichon-Riviere A, Bardach A, Alcaraz A, Caporale J, Augustovski F, Peña Torres E, Osorio D, Pérez Acevedo J, Gamboa Garay O, Gamboa Garay C. *Carga de Enfermedad atribuible al Tabaquismo en Colombia.* Documento Técnico IECS N° 9. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, Buenos Aires, Argentina. Noviembre de 2013 (www.iecs.org.ar).

(3) Título del proyecto: *Empowering healthcare decision makers to achieve regional needs for tobacco in Latin America: Moving forward interventions through evidence packages and cost-effectiveness evaluations (Proyecto IDRC-Componente Número Número-Actividad: 107978-00000000-001).* Las opiniones expresadas en este documento no representan necesariamente las de IDRC o las de su Junta de Gobernadores.

COMO CITAR ESTE INFORME:

Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. El tabaquismo en Colombia. Junio 2017, Buenos Aires, Argentina. Disponible en: www.iecs.org.ar/tabaco



Para un mayor detalle sobre la metodología y los resultados consultar reportes técnicos disponibles en www.iecs.org.ar/tabaco