Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas
A influência do *Priorix™* na habilidade de dirigir veículos e operar máquinas é nula ou insignificante.
Sobredosagem
Foram registrados casos de superdosagem até duas vezes a dose recomendada durante o acompanhamento pós-commercialização, havendo reação adversa do associada à suspensão.
Dados de segurança pré-clínica
Dados não clínicos não revelam perigo especial para humanos com base nos estudos gerais de segurança.
Incompatibilidades
Na ausência de estudos de compatibilidade, esse medicamento não deve ser misturado a nenhum outro medicamento.
PREPARAÇÕES FARMACOLÓGICAS
Para este artigo, consulte o Bula do CMS no site do GMS.
ARMAZENAGEM
A data de validade está indicada no etiqueta e na embalagem.
Armazenar a temperatura refrigerada (2 °C – 8 °C).
Não congelar.
Armazenar no embalagem original para proteger da luz.
Segundo as recomendações do GMS, assim que a vacina for reconstituída ela deve ser armazenada em refrigerador entre +2°C e +8°C, e protegida da luz do sol. a frasco deve ser descartado no final da caixa sessão de imunização ou após seis horas da reconstituição, o que ocorrer primeiro.
APRESENTAÇÃO
Pó em frasco-ampola de vidro tipo I com 1 dose (2 doses no MPR) no final do tomada.
Solução no ampola vidro tipo I para 1 dose (0,5 ml) ou 2 doses (1 ml).
Embalagem com 100 unidades.
Monitor de frascos de vacina (cassette co-pictograma do MPR ou final do tomada)
O monitor de frascos de vacina (MFV) faz parte da tampa e está em todos os lotes de *Priorix™* (marcados pelo QbcoSmithKline Biológicos). O preto colorido que aparece no tampa do frasco é um MFV. Este é um ponto sensível ao tempo que, em combinação com o intervalo de tempo indicado, mostra se a vacina pode ou não ser usada. Se a vacina for usada final, quando a exposição ao calor tiver causado a perda de um ponto do marcador final.
A interpretação do MFV é simples. Observe o ponto colorido. Se ele ainda estiver completamente preto, o frasco e ser de qualidade rather mais claro do que a cor do círculo, a vacina pode ser usada. Quando a cor do quadrado exterior igualar mais escuro do que o do círculo, a frasco deverá ser descartado.
É absolutamente fundamental assegurar que as condições de armazenamento especificadas acima (em particular a rede de frio) sejam respeitadas. A GbcoSmithKline Biológicos não assumirá qualquer responsabilidade caso o *Priorix™* não tenha sido armazenado de acordo com as instruções de armazenamento.

DESCRIPTION

Priorix™, injection e pacchettizzato per l'iniezione sotto forma di polvere e solvente per soluzione.
Vaccino (vivo) di rosolia, parotite e morbillo
Polvere per iniezione (fiala di vetro) e solvente per soluzione (fiala di vetro o siringa preriempita)
Dopo la ricostituzione, una dose (0,5 ml) contiene:

Virus della rosolia (ceppo RA 27/3, coltivato su cellule diploidi umane (WI-38))	non inferiore a 10^3 CCID$_{50}$
Virus della parotite (ceppo Jeryl Lynn [livello B], coltivato su fibroblasti di embrione di pollo)	non inferiore a 10^4,4 CCID$_{50}$
Virus del morbillo (ceppo Schwarz, coltivato su fibroblasti di embrione di pollo)	non inferiore a 10^3 CCID$_{50}$

Il solvente per soluzione iniettabile è una soluzione di sodio cloruro.
Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere la sezione 6.1.
Aspetto del prodotto e contenuto della confezione
Polvere e solvente per soluzione iniettabile in fiala di vetro monodose.
Polvere: da bianco a quasi bianco.
Solvente: soluzione limpida e incolore.
Confezioni da 1, 10, 20, 25, 50 e 100 fiale monodose.
Confezioni da 1, 10, 20, 25, 50 e 100 fiale monodose con ago.
Confezioni da 1, 10, 20, 25, 50 e 100 siringhe preriempite monodose con ago.
Confezioni da 1, 10, 20, 25, 50 e 100 siringhe preriempite monodose senza ago.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
Monitor del flacone del vaccino (cassetta co-pittogramma del MPR o del monitor del flacone)
Il monitor del flacone del vaccino (VVM) fa parte del tappo e si trova su tutti i flaconcini di *Priorix™* (marcatura sulla confezione esterna GlaxoSmithKline Biologicals). Il punto colorato che appare sul tappo del flacone è il VVM. Questo è un punto sensibile al tempo che, in combinazione con il periodo di tempo indicato, mostra se il vaccino può o non può essere utilizzato dopo l'esposizione al calore che ha causato la perdita di un punto del flacone finale.
L'interpretazione del VVM è semplice. Osservare il punto colorato. Se è ancora completamente scuro, il flacone può essere utilizzato finché il colore del punto centrale non è più scuro di quello dell'area circolare esterna. Quando il colore dell'area quadrata esterna è più scuro di quello dell'area circolare, il flacone deve essere scartato.
È assolutamente fondamentale assicurare che le condizioni di conservazione specificate sopra (in particolare quelle relative alla catena del freddo) siano rispettate. GlaxoSmithKline Biologicals non si assume alcuna responsabilità se il vaccino *Priorix™* non è stato conservato in base alle istruzioni di conservazione.

PHARMACEUTICAL FORM

Priorix™, powder and solvent for solution for injection.
Measles, Mumps and Rubella vaccine (live).
After reconstitution, a dose (0.5 ml) contains:

Live attenuated measles virus* (Schwarz strain)	not less than 10^3 CCID$_{50}$
Live attenuated mumps virus† (RIT 4385 strain, derived from Jeryl Lynn strain)	not less than 10^4.4 CCID$_{50}$
Live attenuated rubella virus‡ (Wistar RA 27/3 strain)	not less than 10^3 CCID$_{50}$

* produced in chick embryo cells
† produced in human diploid (MRC-5) cells
‡ on Cell Culture Effective Dose 50%

Excipients
Powder: Amino acids, lactose (anhydrous), mannitol, sorbitol.
Solvent for solution for injection: Water for injections.
Excipients with known effect: The vaccine contains 9 mg of sorbitol.
Reconstituted vaccine is a colourless to slightly yellow liquid.
For the full list of excipients, see section Contraindications.

ADMINISTRATION

The vaccine is for subcutaneous injection, although it can also be given by intramuscular injection, in the bilateral region or in the anterolateral area of the thigh (see also sections Immunization Schedule and Precautions).
The vaccine should preferably be administered subcutaneously in patients with thrombocytopenia or any coagulation disorder (see section Precautions).
The hypodermic Needle-Mixpro-Hub component is a white to light green color.
The catheter is a blue or dark green color.
The solvent and reconstituted vaccine should be inspected visually for any foreign particulate matter and/or variations in physical aspect. In the absence of any such objects or abnormality, the vaccine is free of either type of contaminant and reconstituted vaccine.
The vaccine must be reconstituted by adding the entire content of the supplied ampoule of solvent to the vial containing the powder. After the addition of the solvent to the powder, the mixture should be well shaken until the powder is completely dissolved.
Due to minor variation of its pH, the reconstituted vaccine may vary in color from pale pink to pale yellow without alteration of the vaccine potency.
After reconstitution
Close presentation
Withdraw the entire content of the vial and administer it. A new needle should be used to administer the vaccine.
Open presentation
Withdraw a dose (0.5 ml) each dose of 0.5 ml should be withdrawn using a sterile needle and syringe; precautions should be taken to avoid contamination of the content. A new needle should be used to administer each individual dose of the vaccine.
Contacts with disinfectants should be avoided (see section Precautions).
Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

IMMUNIZATION SCHEDULE

Priorix™ is indicated for the active immunization against measles, mumps, and rubella.
A single dose (0.5 ml) of the reconstituted vaccine is recommended.
In countries where the measles and mortality from measles is high in the first year of life, the recommended age for immunization using MMR is at 6 months of age (270 days) or soon after (see also section Precautions).In countries where measles incidence is low and the risk of measles-containing vaccine and to increase the proportion of the population that is fully immunized, The second dose of measles-containing vaccine can be given through routine or supplemental activities (see also section "Pharmacological properties").
The safety and efficacy of *Priorix™* in infants under 6 months of age have not been established.
Priorix™ may be used in individuals who have previously been vaccinated with another monovalent or combined measles, mumps and rubella vaccine.
Use with other vaccines
Clinical studies have demonstrated that *Priorix™* can be given simultaneously with any of the following monovalent or combination vaccines (including hexavalent vaccines (DTPa-HBV-IPV/Hib): diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (DTPa), reduced antigen diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (Tpa), haemophilus influenzae type b vaccine (Hib), inactivated polio vaccine (IPV), hepatitis B vaccine (HBV), meningococcal serogroup A vaccine (MenA), meningococcal serogroup C conjugate vaccine (MenC), meningococcal serogroups A, C, W-135 and Y conjugate vaccine (MenACWY), pneumococcal conjugate vaccine (PCV) and 7-valent pneumococcal conjugate vaccine in accordance with local recommendations.
Due to an increased risk of fever, tenderness at the injection site, change in eating habits and irritability when ***Priorix™*** was co-administered with a combined measles–mumps–rubella–varicella (MMR–V) vaccine, separate vaccination with MMR and varicella vaccine is considered when possible (see section Precautions).
There are no data to support the use of *Priorix™* with any other vaccines.
If ***Priorix™*** is to be given at the same time as another injectable vaccine, the vaccines should always be administered at different injection sites.
If not given at the same time, an interval of at least one month is recommended between administration of ***Priorix™*** and other live attenuated vaccines.
If tuberculin testing has to be done it should be carried out before or simultaneously with vaccination since it has been reported that combined measles, mumps and rubella vaccines may cause a temporary depression of tuberculin skin sensitivity. As this anergy may last up to a maximum of 6 weeks, tuberculin testing should not be performed within that period after vaccination to avoid false negative results.
In subjects who have received human gammaglobulins or a blood transfusion, vaccination should be delayed for three months (see also section Precautions). Depending on the dose of human globulins administered because of the likelihood of vaccine failure due to passively acquired measles, mumps and rubella antibodies.
SIDE EFFECTS
Summary of the safety profile
The safety profile presented below is based on a total of approximately 12,000 subjects administered ***Priorix™*** in clinical trials.

Adverse reactions which might occur following the use of a combined measles, mumps, rubella vaccine compared to those reported following the administration of the monovalent vaccines alone or in combination.
In controlled clinical studies, signs and symptoms were actively monitored during a 42-day follow-up period. The occurrence was also requested to report any undesirable events during this period.
The most common adverse reactions following ***Priorix™*** administration were injection site redness and fever (≥39°C rectal) in ≥5.5°F (≥39°C) body temperature.
Tabulated list of adverse reactions
Adverse reactions reported are listed according to the following frequency:
Very common: (≥1/10)
Common: (≥1/100 to <1/10)
Uncommon: (≥1/1,000 to <1/100)
Rare: (≥1/10,000 to <1/1,000)
Clinical trial data

System Organ Class	Frequency	Adverse reactions
Infections and infestations	Common	Upper respiratory tract infection
	Uncommon	Otitis media
Blood and lymphatic system disorders	Uncommon	Lymphadenopathy
Immune system disorders	Rare	Allergic reactions
Metabolism and nutrition disorders	Uncommon	Anorexia
Psychiatric disorders	Uncommon	Nervousness, abnormal crying, insomnia
Nervous system disorders	Rare	Febrile convulsions
Eye disorders	Uncommon	Conjunctivitis
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders	Uncommon	Rhinorrhoea, cough
Gastrointestinal disorders	Uncommon	Vomiting, diarrhoea, abdominal pain, abdominal pain, diarrhoea
Skin and subcutaneous tissue disorders	Common	rash
General disorders and administration site conditions	Very common	redness at the injection site, fever ≥38°C (rectal) or ≥37.2°C (axillary)
	Common	pain and swelling at the injection site, fever ≥39°C (rectal) or ≥38°C (axillary)

In general, the frequency category for adverse reactions was similar for the first and second vaccine doses. The exception is the was pain at the injection site which was "Common" after the first vaccine dose and "Very common" after the second vaccine dose.
Post-marketing data
The following adverse reactions have been identified in rare occasions during post-marketing surveillance. Because they are reported voluntarily from a population of unknown size, a true estimate of frequency cannot be provided.

System Organ Class	Adverse reactions
Infections and infestations	meningitis, measles-like syndrome, mumps-like syndrome (including orchitis, epididymitis and parotitis)
Blood and lymphatic system disorders	thrombocytopenia, thrombocytopenic purpura
Immune system disorders	anaphylactic reaction
Nervous system disorders	encephalitis*, cerebellitis, cerebellitis (the symptoms including transient gait disturbance and transient ataxia), Guillain-Barre syndrome, transverse myelitis, peripheral neuritis
Vascular disorders	vasculitis
Skin and subcutaneous tissue disorders	erythema multiforme
Musculoskeletal and connective tissue disorders	arthralgia, arthritis

* Encephalitis has been reported with a frequency below 1 per 10 million doses. The risk following administration of the vaccine is far below the risk of encephalitis caused by natural diseases (measles: 1 in 1000 to 2000 cases; mumps: 1 in 10,000 cases; rubella: approximately 1 in 3000 cases).
Accidental intravascular administration may give rise to severe reactions or even shock, therefore precautions depend on the severity of the reaction (see section Precautions).

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity to the active substances or to any of the excipients listed in section Description or reversals.
A history of contact dermatitis to neomycin is not a contraindication to the administration of the vaccine.
Any febrile or acute infection; vaccination should be postponed.
Severe blood disorder, cellular (primary or acquired) immunodeficiency, e.g. severe combined immunodeficiency, agammaglobulinemia and AIDS or symptomatic HIV infection or an age-specific CD4+ T-lymphocyte percentage (see section Pharmacological properties).
Active tuberculosis; HIV infection (CD4+ < 25%, children between 1 and 5 years old; CD4+ < 15% between 36–59 months; CD4+ < 15% (see section Precautions).
Pregnancy. Furthermore, pregnancy should be avoided for 1 month following vaccination (see section Pregnancy and lactation).
As with other vaccines, the administration of ***Priorix™*** should be postponed in subjects suffering from acute severe febrile illness. The presence of a minor infection, such as a cold, should not result in the deferment of vaccination.

PRECAUTIONS

As with all injectable vaccines, appropriate medical treatment and supervision should always be readily available in case of a rare anaphylactic event following the administration of the vaccine.
Alcohol and other disinfecting agents must be allowed to evaporate from the skin before injection of the vaccine since they can inactivate the attenuated viruses in the vaccine.
Infants below 12 months of age may not respond sufficiently to the measles component of the vaccine, due to the possible persistence of maternally-derived antibodies. This should not preclude the use of the vaccine in younger infants (<12 months) since vaccination may be indicated in some situations such as high-risk areas. In these circumstances revaccination at or after 12 months of age is needed.

DESCRIPCIÓN

Priorix™, polvo y disolvente para solución para inyección.
Vacuna contra sarampión, parotiditis y rubeola (viva).
Tras la reconstitución, una dosis (0,5 ml) contiene:

Virus del sarampión vivo atenuado* (cepa Schwarz)	no menos de 10^3 CCID$_{50}$
Virus de la parotiditis vivo atenuado† (cepa RIT 4385, derivada de la cepa Jeryl Lynn)	no menos de 10^4,4 CCID$_{50}$
Virus de la rubeola vivo atenuado‡ (cepa Wistar RA 27/3)	no menos de 10^3 CCID$_{50}$

* producido en células de embrión de pollo
† producido en células diploides humanas (MRC-5)
‡ en dosis eficaz en cultivo celular al 50 %

Excipientes
Polvo: aminoácidos, lactosa (anhidra), manitol, sorbitol.
Disolvente para solución inyectable: agua para preparaciones inyectables.
Excipientes con efecto conocido: la vacuna contiene 9 mg de sorbitol.
Tras la reconstitución, la vacuna es un líquido incoloro a ligeramente amarillento.
Para consultar la lista completa de excipientes, véase la sección Contraindicaciones.

ADMINISTRACIÓN

La vacuna se debe administrar por inyección subcutánea, aunque también puede administrarse por inyección intramuscular, en la región bilateral o en la zona anterolateral alta del muslo (véanse también las secciones Inmunización Schedule and Precautions).
La vacuna debe preferirse por administrarse subcutáneamente a pacientes con trombocitopenia o con cualquier trastorno de la coagulación (véase la sección Precauciones especiales).
El componente Needle-Mixpro-Hub es de color blanco a verde claro.
El componente Needle-Mixpro-Hub es de color blanco a verde claro.
El catéter es de color azul o verde oscuro.
El catéter es de color azul o verde oscuro.
El disolvente y la vacuna reconstituida deben inspeccionarse visualmente para detectar cualquier partícula extraña y/o variación del aspecto físico. En ausencia de dichas partículas o anomalías, la vacuna no contiene ninguno de los dos tipos de contaminantes mencionados y tiene un aspecto homogéneo.
La vacuna debe reconstituirse añadiendo todo el contenido del vial suministrado de disolvente al vial que contiene el polvo. Después de añadir el disolvente al polvo, la mezcla debe agitarse bien hasta que el polvo se disuelva por completo.
Debido a una ligera variación de su pH, la vacuna reconstituida puede variar de color, de rosa pálido a amarillo pálido, sin que ello afecte a su potencia.
Después de la reconstitución
Presentación cerrada
Extraer todo el contenido del vial y administrarlo. Para administrar la vacuna debe utilizarse una aguja nueva.
Presentación abierta
Extraer una dosis (0,5 ml) de cada dosis de 0,5 ml con una aguja y una jeringa estériles; deben tomarse precauciones para evitar la contaminación del contenido. Para administrar cada dosis de la vacuna debe utilizarse una aguja nueva.
Debe evitarse el contacto con desinfectantes (véase la sección Precauciones especiales).
Cualquier producto no utilizado o material de desecho debe eliminarse de acuerdo con la normativa local.

INMUNIZACIÓN

Priorix™ está indicada para la inmunización activa contra el sarampión, la parotiditis y la rubeola.
Se recomienda una dosis única (0,5 ml) de la vacuna reconstituida.
En países donde la incidencia del sarampión y la mortalidad por sarampión sean elevadas en el primer año de vida, la edad recomendada para la inmunización con SPR es de 6 meses de edad (270 días) o poco después (véase también la sección Precauciones especiales). En países donde la incidencia del sarampión sea baja y el riesgo asociado a la vacuna contra el sarampión sea inferior al riesgo de la enfermedad y para aumentar la proporción de la población que está totalmente inmunizada, se puede administrar una segunda dosis de la vacuna contra el sarampión mediante actividades sistemáticas o suplementarias (véase también la sección "Propiedades farmacológicas").
No se ha establecido la seguridad y eficacia de *Priorix™* en niños menores de 6 meses.
Priorix™ puede utilizarse en personas que hayan recibido previamente otra vacuna monovalente o combinada contra el sarampión, la parotiditis y la rubeola.
Uso con otras vacunas
Los estudios clínicos han demostrado que ***Priorix™*** puede administrarse simultáneamente con cualquiera de las siguientes vacunas monovalentes o combinadas (incluidas las vacunas hexavalentes (DTPa-HBV-IPV/Hib): vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina acelular (DTPa), vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina acelular con antígenos reducidos (Tpa), vacuna contra la infección por *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib), vacuna antipoliomielítica inactivada (VPI), vacuna contra la hepatitis B (VHB), vacuna antimeningocócica del serogrupo A (MenA), vacuna antimeningocócica del serogrupo C conjugada (MenC), vacuna antimeningocócica de los serogrupos A, C, W-135 y Y conjugada (MenACWY), vacuna antineumocócica conjugada (VNC) y vacuna antineumocócica heptavalente conjugada de acuerdo con las recomendaciones locales.
Debido a la mayor incidencia de fiebre, sensibilidad en el lugar de la inyección, irritabilidad y alteración de los hábitos alimenticios cuando ***Priorix™*** se administró simultáneamente con una vacuna combinada contra el sarampión, la parotiditis, la rubeola y la varicela (SPRV), se recomienda la vacunación por separado contra el sarampión, la parotiditis y la rubeola y contra la varicela siempre que sea posible (véase la sección Precauciones especiales).
No hay datos que respalden el uso de *Priorix™* con otras vacunas.
Si ***Priorix™*** se va a administrar al mismo tiempo que otra vacuna inyectable, las vacunas deben administrarse siempre en puntos de inyección diferentes.
Si no se administran al mismo tiempo, se recomienda un intervalo de al menos un mes entre la administración de ***Priorix™*** y otras vacunas vivas atenuadas.
Si es necesario realizar la prueba de la tuberculina, esta debe llevarse a cabo antes o al mismo tiempo que la vacunación, ya que se ha notificado que las vacunas combinadas contra el sarampión, la parotiditis y la rubeola pueden causar una depresión temporal de la sensibilidad cutánea a la tuberculina. Como esta anergia puede durar hasta un máximo de 6 semanas, no debe realizarse la prueba de la tuberculina durante ese período tras la vacunación para evitar resultados falsos negativos.
En personas que hayan recibido gammaglobulinas humanas o una transfusión de sangre, la vacunación debe retrasarse tres meses (véase también la sección Precauciones especiales). Según la dosis de globulinas humanas administrada debido a la probabilidad de que la vacuna no funcione debido a los anticuerpos adquiridos pasivamente contra el sarampión, la parotiditis y la rubeola.

REACCIONES ADVERSAS

Resumen del perfil de seguridad
El perfil de seguridad que se presenta a continuación se basa en un total de aproximadamente 12 000 personas a las que se administró ***Priorix™*** en ensayos clínicos.
Reacciones adversas que podrían aparecer tras la administración de una vacuna combinada contra el sarampión, la parotiditis y la rubeola en comparación con las notificadas tras la administración de las vacunas monovalentes por separado o en combinación.
En los ensayos clínicos controlados, se hizo un seguimiento activo de los signos y síntomas durante un período de seguimiento de 42 días. También se solicitó que se notificaran los acontecimientos adversos durante este período.
Las reacciones adversas más frecuentes tras la administración de ***Priorix™*** fueron enrojecimiento en el lugar de la inyección y fiebre (≥39 °C rectal) en la temperatura corporal ≥38,5 °C (≥39 °C rectal).
Lista tabulada de reacciones adversas
Las reacciones adversas notificadas se enumeran según la siguiente frecuencia:
Muy frecuentes: (≥1/10)
Frecuentes: (≥1/100 a <1/10)
Poco frecuentes: (≥1/1.000 a <1/100)
Raras: (≥1/10.000 a <1/1.000)
Datos de ensayos clínicos

Clasificación «Sistema-Órgano»	Frecuencia	Reacciones adversas
Infecciones e infestaciones	Frecuentes	Infección del tracto superior
	Poco frecuentes	Otitis media
Trastornos de la sangre y del sistema linfático	Poco frecuentes	Linfadenopatía
Trastornos del sistema inmunitario	Raras	Reacciones alérgicas
Trastornos del metabolismo y de la nutrición	Poco frecuentes	Anorexia
Trastornos psiquiátricos	Poco frecuentes	Nerviosismo, llanto anormal, insomnio
Trastornos del sistema nervioso	Raras	Convulsiones febriles
Trastornos oculares	Poco frecuentes	Conjuntivitis
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	Poco frecuentes	Rinorrea, tos
Trastornos gastrointestinales	Poco frecuentes	Vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor abdominal, diarrea
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	Frecuentes	Erupción cutánea
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración	Muy frecuentes	Enrojecimiento en el lugar de la inyección, fiebre ≥38 °C (rectal) o ≥37,2 °C (axilar)
	Frecuentes	Dolor e hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre ≥39 °C (rectal) o ≥38 °C (axilar)

En general, la categoría de frecuencia de las reacciones adversas fue similar para la primera y la segunda dosis de la vacuna. La excepción fue el dolor en el lugar de la inyección, que fue «Frecuente» tras la primera dosis y «Muy frecuente» tras la segunda dosis.
Datos tras la comercialización
Se han identificado las siguientes reacciones adversas en casos aislados durante la vigilancia tras la comercialización. Como se notifican de forma voluntaria en una población de tamaño desconocido, no es posible calcular una estimación real de la frecuencia.

Clasificación «Sistema-Órgano»	Reacciones adversas
Infecciones e infestaciones	Meningitis, síndrome similar al sarampión, síndrome similar a la parotiditis (incluidas orquitis, epididimitis y parotiditis)
Trastornos de la sangre y del sistema linfático	Trombocitopenia, trombocitopenia púrpura
Trastornos del sistema inmunitario	Anafilaxia
Trastornos del sistema nervioso	Encefalitis*, cerebelitis, cerebelitis (síntomas incluidos trastornos de la marcha y ataxia transitorios), síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa, neuritis periférica
Trastornos vasculares	Vasculitis
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	Eritema multiforme
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo	Artralgia, artritis

* Se ha notificado encefalitis con una frecuencia inferior a 1 por cada 10 millones de dosis. El riesgo tras la administración de la vacuna es muy inferior al riesgo de encefalitis causada por enfermedades naturales (sarampión: 1 de cada 1000 a 2000 casos; parotiditis: 1 de cada 10 000 casos; rubeola: aproximadamente 1 de cada 3000 casos).
La administración intravascular accidental puede provocar reacciones graves o incluso shock, por lo que las precauciones dependen de la gravedad de la reacción (véase la sección Precauciones especiales).

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los principios activos o a cualquiera de los excipientes incluidos en la sección Composición o reversos.
Antecedentes de dermatitis de contacto a neomicina no es una contraindicación para la administración de la vacuna.
Cualquier infección febril o aguda; debe posponerse la vacunación.
Trastornos graves de la sangre, inmunodeficiencia celular (primaria o adquirida), p. ej., inmunodeficiencia combinada grave, agammaglobulinemia y sida o infección sintomática por VIH o un porcentaje de linfocitos T CD4+ específico de la edad (véase la sección Propiedades farmacológicas).
Tuberculosis activa; infección por VIH (CD4+ < 25 %, niños de entre 1 y 5 años; CD4+ < 15 % entre 36 y 59 meses; CD4+ < 15 % (véase la sección Precauciones especiales).
Embarazo. Además, debe evitarse el embarazo durante 1 mes tras la vacunación (véase la sección Embarazo y lactancia).
Al igual que con otras vacunas, la administración de ***Priorix™*** debe posponerse en personas que padezcan una enfermedad febril aguda grave. La presencia de una infección leve, como un resfriado, no debe ser motivo para aplazar la vacunación.

PRECAUCIONES ESPECIALES

Como con todas las vacunas inyectables, siempre debe haber disponible un tratamiento médico y supervisión adecuados en caso de que se produzca un episodio anafiláctico raro tras la administración de la vacuna.
Debe permitirse que el alcohol y otros desinfectantes se evaporen de la piel antes de la inyección de la vacuna, ya que pueden inactivar los virus atenuados de la vacuna.
Los lactantes menores de 12 meses de edad pueden no responder suficientemente al componente del sarampión de la vacuna, debido a la posible persistencia de anticuerpos maternos. Esto no debe impedir el uso de la vacuna en lactantes más jóvenes (<12 meses) ya que puede estar indicada la vacunación en algunas situaciones como las de zonas de alto riesgo. En estas circunstancias debe administrarse una segunda dosis de la vacuna a los 12 meses de edad o más tarde.

Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas
A influência do *Priorix™* na habilidade de dirigir veículos e operar máquinas é nula ou insignificante.
Sobredosagem
Foram registrados casos de superdosagem até duas vezes a dose recomendada durante o acompanhamento pós-commercialização, havendo reação adversa do associada à suspensão.
Dados de segurança pré-clínica
Dados não clínicos não revelam perigo especial para humanos com base nos estudos gerais de segurança.
Incompatibilidades
Na ausência de estudos de compatibilidade, esse medicamento não deve ser misturado a nenhum outro medicamento.
PREPARAÇÕES FARMACOLÓGICAS
Para este artigo, consulte o Bula do CMS no site do GMS.
ARMAZENAGEM
A data de validade está indicada no etiqueta e na embalagem.
Armazenar a temperatura refrigerada (2 °C – 8 °C).
Não congelar.
Armazenar no embalagem original para proteger da luz.
Segundo as recomendações do GMS, assim que a vacina for reconstituída ela deve ser armazenada em refrigerador entre +2°C e +8°C, e protegida da luz do sol. a frasco deve ser descartado no final da caixa sessão de imunização ou após seis horas da reconstituição, o que ocorrer primeiro.
APRESENTAÇÃO
Pó em frasco-ampola de vidro tipo I com 1 dose (2 doses no MPR) no final do tomada.
Solução no ampola vidro tipo I para 1 dose (0,5 ml) ou 2 doses (1 ml).
Embalagem com 100 unidades.
Monitor de frascos de vacina (cassette co-pictograma do MPR ou final do tomada)
O monitor de frascos de vacina (MFV) faz parte da tampa e está em todos os lotes de *Priorix™* (marcados pelo QbcoSmithKline Biológicos). O preto colorido que aparece no tampa do frasco é um MFV. Este é um ponto sensível ao tempo que, em combinação com o intervalo de tempo indicado, mostra se a vacina pode ou não ser usada. Se a vacina for usada final, quando a exposição ao calor tiver causado a perda de um ponto do marcador final.
A interpretação do MFV é simples. Observe o ponto colorido. Se ele ainda estiver completamente preto, o frasco e ser de qualidade rather mais claro do que a cor do círculo, a vacina pode ser usada. Quando a cor do quadrado exterior igualar mais escuro do que o do círculo, a frasco deverá ser descartado.
É absolutamente fundamental assegurar que as condições de armazenamento especificadas acima (em particular a rede de frio) sejam respeitadas. A GbcoSmithKline Biológicos não assumirá qualquer responsabilidade caso o *Priorix™* não tenha sido armazenado de acordo com as instruções de armazenamento.

DESCRIPTION

Priorix™, injection e pacchettizzato per l'iniezione sotto forma di polvere e solvente per soluzione.
Vaccino (vivo) di rosolia, parotite e morbillo
Polvere per iniezione (fiala di vetro) e solvente per soluzione (fiala di vetro o siringa preriempita)
Dopo la ricostituzione, una dose (0,5 ml) contiene:

Virus della rosolia (ceppo RA 27/3, coltivato su cellule diploidi umane (WI-38))	non inferiore a 10^3 CCID$_{50}$
Virus della parotite (ceppo Jeryl Lynn [livello B], coltivato su fibroblasti di embrione di pollo)	non inferiore a 10^4,4 CCID$_{50}$
Virus del morbillo (ceppo Schwarz, coltivato su fibroblasti di embrione di pollo)	non inferiore a 10^3 CCID$_{50}$

Il solvente per soluzione iniettabile è una soluzione di sodio cloruro.
Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere la sezione 6.1.
Aspetto del prodotto e contenuto della confezione
Polvere e solvente per soluzione iniettabile in fiala di vetro monodose.
Polvere: da bianco a quasi bianco.
Solvente: soluzione limpida e incolore.
Confezioni da 1, 10, 20, 25, 50 e 100 fiale monodose.
Confezioni da 1, 10, 20, 25, 50 e 100 fiale monodose con ago.
Confezioni da 1, 10, 20, 25, 50 e 100 siringhe preriempite monodose con ago.
Confezioni da 1, 10, 20, 25, 50 e 100 siringhe preriempite monodose senza ago.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
Monitor del flacone del vaccino (cassetta co-pittogramma del MPR o del monitor del flacone)
Il monitor del flacone del vaccino (VVM) fa parte del tappo e si trova su tutti i flaconcini di *Priorix™* (marcatura sulla confezione esterna GlaxoSmithKline Biologicals). Il punto colorato che appare sul tappo del flacone è il VVM. Questo è un punto sensibile al tempo che, in combinazione con il periodo di tempo indicato, mostra se il vaccino può o non può essere utilizzato dopo l'esposizione al calore che ha causato la perdita di un punto del flacone finale.
L'interpretazione del VVM è semplice. Osservare il punto colorato. Se è ancora completamente scuro, il flacone può essere utilizzato finché il colore del punto centrale non è più scuro di quello dell'area circolare esterna. Quando il colore dell'area quadrata esterna è più scuro di quello dell'area circolare, il flacone deve essere scartato.
È assolutamente fondamentale assicurare che le condizioni di conservazione specificate sopra (in particolare quelle relative alla catena del freddo) siano rispettate. GlaxoSmithKline Biologicals non si assume alcuna responsabilità se il vaccino *Priorix™* non è stato conservato in base alle istruzioni di conservazione.

PHARMACEUTICAL FORM

Priorix™, powder and solvent for solution for injection.
Measles, Mumps and Rubella vaccine (live).
After reconstitution, a dose (0.5 ml) contains:

Live attenuated measles virus* (Schwarz strain)	not less than 10^3 CCID$_{50}$
Live attenuated mumps virus† (RIT 4385 strain, derived from Jeryl Lynn strain)	not less than 10^4.4 CCID$_{50}$
Live attenuated rubella virus‡ (Wistar RA 27/3 strain)	not less than 10^3 CCID$_{50}$

* produced in chick embryo cells
† produced in human diploid (MRC-5) cells
‡ on Cell Culture Effective Dose 50%

Excipients
Powder: Amino acids, lactose (anhydrous), mannitol, sorbitol.
Solvent for solution for injection: Water for injections.
Excipients with known effect: The vaccine contains 9 mg of sorbitol.
Reconstituted vaccine is a colourless to slightly yellow liquid.
For the full list of excipients, see section Contraindications.

ADMINISTRATION

The vaccine is for subcutaneous injection, although it can also be given by intramuscular injection, in the bilateral region or in the anterolateral area of the thigh (see also sections Immunization Schedule and Precautions).
The vaccine should preferably be administered subcutaneously in patients with thrombocytopenia or any coagulation disorder (see section Precautions).
The hypodermic Needle-Mixpro-Hub component is a white to light green color.
The catheter is a blue or dark green color.
The solvent and reconstituted vaccine should be inspected visually for any foreign particulate matter and/or variations in physical aspect. In the absence of any such objects or abnormality, the vaccine is free of either type of contaminant and reconstituted vaccine.
The vaccine must be reconstituted by adding the entire content of the supplied ampoule of solvent to the vial containing the powder. After the addition of the solvent to the powder, the mixture should be well shaken until the powder is completely dissolved.
Due to minor variation of its pH, the reconstituted vaccine may vary in color from pale pink to pale yellow without alteration of the vaccine potency.
After reconstitution
Close presentation
Withdraw the entire content of the vial and administer it. A new needle should be used to administer the vaccine.
Open presentation
Withdraw a dose (0.5 ml) each dose of 0.5 ml should be withdrawn using a sterile needle and syringe; precautions should be taken to avoid contamination of the content. A new needle should be used to administer each individual dose of the vaccine.
Contacts with disinfectants should be avoided (see section Precautions).
Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

IMMUNIZATION SCHEDULE

Priorix™ is indicated for the active immunization against measles, mumps, and rubella.
A single dose (0.5 ml) of the reconstituted vaccine is recommended.
In countries where the measles and mortality from measles is high in the first year of life, the recommended age for immunization using MMR is at 6 months of age (270 days) or soon after (see also section Precautions).In countries where measles incidence is low and the risk of measles-containing vaccine and to increase the proportion of the population that is fully immunized, The second dose of measles-containing vaccine can be given through routine or supplemental activities (see also section "Pharmacological properties").
The safety and efficacy of ***Priorix™*** in infants under 6 months of age have not been established.
Priorix™ may be used in individuals who have previously been vaccinated with another monovalent or combined measles, mumps and rubella vaccine.
Use with other vaccines
Clinical studies have demonstrated that ***Priorix™*** can be given simultaneously with any of the following monovalent or combination vaccines (including hexavalent vaccines (DTPa-HBV-IPV/Hib): diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (DTPa), reduced antigen diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (Tpa), haemophilus influenzae type b vaccine (Hib), inactivated polio vaccine (IPV), hepatitis B vaccine (HBV), meningococcal serogroup A vaccine (MenA), meningococcal serogroup C conjugate vaccine (MenC), meningococcal serogroups A, C, W-135 and Y conjugate vaccine (MenACWY), pneumococcal conjugate vaccine (PCV) and 7-valent pneumococcal conjugate vaccine in accordance with local recommendations.
Due to an increased risk of fever, tenderness at the injection site, change in eating habits and irritability when ***Priorix™*** was co-administered with a combined measles–mumps–rubella–varicella (MMR–V) vaccine, separate vaccination with MMR and varicella vaccine is considered when possible (see section Precautions).
There are no data to support the use of *Priorix™* with any other vaccines.
If

Due caution should be employed in administration of ***Priorix™*** to individuals with Central Nervous System (CNS) disorder, susceptibility to febrile convulsions or family history of convulsions. Vaccinees with a history of febrile convulsions should be closely followed-up.

The measles and mumps components of the vaccine are produced in chick embryo cell culture and may therefore contain traces of egg protein. Persons with a history of anaphylactic, anaphylactoid, or other immediate reactions (e.g. generalised urticaria, swelling of the mouth and throat, difficulty in breathing, hypotension, or shock) subsequent to egg ingestion may be at an enhanced risk of immediate-type hypersensitivity reactions after vaccination, although these types of reactions have been shown to be very rare. Individuals who have experienced anaphylaxis after egg ingestion should be vaccinated with extreme caution, with adequate treatment for anaphylaxis on hand should such a reaction occur.

Limited protection against measles may be obtained by vaccination up to 72 hours after exposure to natural measles.

Syncope (fainting) can occur following, or even before, any vaccination especially in adolescents as a psychogenic response to the needle injection. This can be accompanied by several neurological signs such as transient visual disturbance, paraesthesia and tonic-clonic limb movements during recovery. It is important that procedures are in place to avoid injury from faints.

As with any vaccine, a protective immune response may not be elicited in all vaccinees.

Priorix™ should under no circumstances be administered intravascularly.

Thrombocytopenia

Cases of worsening of thrombocytopenia and cases of recurrence of thrombocytopenia in subjects who suffered thrombocytopenia after the first dose have been reported following vaccination with live measles, mumps and rubella vaccines. MMR-associated thrombocytopenia is rare and generally self-limited. In patients with existing thrombocytopenia or a history of thrombocytopenia after measles, mumps or rubella vaccination the risk-benefit of administering ***Priorix™*** should be carefully evaluated. These patients should be vaccinated with caution and preferably using subcutaneous route.

Immunocompromised patients

Vaccination may be considered in patients with selected immune deficiencies where the benefits outweigh the risks (e.g. asymptomatic HIV subjects, IgG subclass deficiencies, congenital neutropenia, chronic granulomatous disease and complement deficiency diseases).

Immunocompromised patients who have no contraindication for this vaccination (see section *Contraindications*) may not respond as well as immunocompetent subjects, therefore some of these patients may acquire measles, mumps or rubella in case of contact, despite appropriate vaccine administration. These patients should be monitored carefully for signs of measles, parotitis and rubella.

Transmission

Transmission of measles and mumps virus from vaccinees to susceptible contacts has never been documented. Pharyngeal excretion of the rubella and measles virus is known to occur about 7 to 28 days after vaccination with peak excretion around the 11th day. However there is no evidence of transmission of these excreted vaccine viruses to susceptible contacts. Transmission of the rubella vaccine virus to infants via breast milk as well as transplacental transmission has been documented without any evidence of clinical disease.

Pregnancy and lactation

Fertility

Priorix™ has not been evaluated in fertility studies.

Pregnancy

Pregnant women should not be vaccinated with ***Priorix™***.

However, fetal damage has not been documented when measles, mumps or rubella vaccines have been given to pregnant women.

Even if a theoretical risk cannot be excluded yet, no cases of congenital rubella syndrome have been reported in more than 3500 susceptible women who were unknowingly in early stages of pregnancy when vaccinated with rubella containing vaccines. Therefore, inadvertent vaccination of unknowingly pregnant women with measles, mumps and rubella containing vaccines should not be a reason for termination of pregnancy.

Pregnancy should be avoided for 1 month following vaccination. Women who intend to become pregnant should be advised to delay.

Breast-feeding

There is limited experience with ***Priorix™*** during breast-feeding. Studies have shown that breast-feeding postpartum women vaccinated with live attenuated rubella vaccines may secrete the virus in breast milk and transmit it to breast-fed infants without evidence of any symptomatic disease. Only in the event the child is confirmed or suspected to be immunodeficient, risks and benefits of vaccinating the mother should be evaluated (see section *Contraindications*).

Effects on the ability to drive and use machines

Priorix™ has no or negligible influence on the ability to drive and use machines.

Overdose

Cases of overdose (up to 2 times the recommended dose) have been reported during post-marketing surveillance. No adverse reactions have been associated to the overdose.

Preclinical safety data

Non-clinical data reveal no special hazard for humans based on general safety studies.

Incompatibilities

In the absence of compatibility studies, this medicinal product must not be mixed with other medicinal products.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

For this section, see WHO Product Information on the WHO website.

STORAGE

The expiry date is indicated on the label and packaging.

Store and transport refrigerated (2°C – 8°C).

Do not freeze.

Store in the original package in order to protect from light.

According to WHO recommendations, once the vaccine has been reconstituted, it should be maintained between +2°C to +8°C and protected from the sunlight; the vial must be discarded at the end of each immunisation session or after 6 hours from reconstitution, whichever comes first.

PRESENTATION

Powder in vial (Type I glass) for 1 dose or 2 doses with rubber stopper.

Solution in ampoule (Type I glass) for 1 dose (0.5 ml) or 2 doses (1 ml).

Pack size of 100.

Vaccine Vial Monitor (see VVM pictogram at the end of the leaflet)

The Vaccine Vial Monitor (VVM) is part of the cap used for all ***Priorix™*** batches supplied by GlaxoSmithKline Biologicals. The colour dot that appears on the cap of the vial is a VVM. This is a time-temperature sensitive dot that provides an indication of the cumulative heat to which the vial has been exposed. It warns the end user when exposure to heat is likely to have degraded the vaccine beyond an acceptable level.

The interpretation of the VVM is simple. Focus on the central square. Its colour will change progressively. As long as the colour of this square is lighter than the colour of the ring, then the vaccine can be used. As soon as the colour of the central square is the same colour as the ring or of a darker colour than the ring, then the vial should be discarded.

It is absolutely critical to ensure that the storage conditions specified above (in particular the cold chain) are complied with. GlaxoSmithKline Biologicals will assume no liability in the event ***Priorix™*** has not been stored in compliance with these storage instructions.

DESCRIPTION

Priorix™, poudre et solvant pour solution injectable

Vaccin (vivant) contre la rougeole, les oreillons et la rubéole

Après reconstitution, 1 dose (0,5 ml) contient :

Virus de la rougeole vivant atténué[1] (souche Schwarz) au moins $10^{3,0}$ $DICC_{50}$[3]

Virus des oreillons vivant atténué[1] (souche RIT 4385 issue de la souche Jeryl Lynn) au moins $10^{3,7}$ $DICC_{50}$[3]

Virus de la rubéole vivant atténué[2] (souche Wistar RA 27/3) au moins $10^{3,0}$ $DICC_{50}$[3]

[1] produit sur cellules d'embryon de poulet

[2] produit sur cellules diploïdes humaines (MRC-5)

[3] dose infectant 50% des cultures cellulaires

Excipients :

Poudre : acides aminés, lactose (anhydre), mannitol, sorbitol.

Solvant : eau pour injections.

Excipients à effet notoire : le vaccin contient 9 mg de sorbitol.

La néomycine est présente sous une forme résiduelle dans le processus de fabrication (voir rubrique « Contre-indications »).

ADMINISTRATION

Priorix™ est administré en injection sous-cutanée, mais peut également être administré en injection intramusculaire, dans la région deltoïde ou dans la partie antérolatérale de la cuisse (voir rubriques « Schéma de vaccination » et « Précautions »).

Le vaccin doit être administré de préférence par voie sous-cutanée chez les patients présentant une thrombopénie ou tout trouble de la coagulation (voir rubrique « Précautions »).

Le composant lyophilisé du vaccin rougeole-oreillons-rubéole est une poudre légèrement rose.

Le solvant est une solution claire et incolore.

Avant l'administration, le solvant et le vaccin reconstitué doivent être inspectés visuellement pour rechercher la présence de particules étrangères et/ou une altération de l'aspect physique. Si l'une de ces anomalies est observée, le solvant ou le vaccin reconstitué ne doivent pas être utilisés.

Le vaccin doit être reconstitué en ajoutant la totalité du contenu de l'ampoule de solvant fournie dans le flacon contenant la poudre. Après avoir ajouté le solvant à la poudre, bien agiter le mélange jusqu'à dissolution complète de la poudre.

En raison de variations mineures du pH du vaccin reconstitué, la couleur peut varier de pêche claire à rose fuchsia, sans altération de l'efficacité du vaccin.

Après la reconstitution :

Présentation unidose :

Prélever la totalité du flacon et l'administrer. Une aiguille neuve doit être utilisée pour administrer le vaccin.

Présentation en 2 doses :

En cas d'utilisation d'un flacon multidoses, chaque dose de 0,5 ml doit être prélevée à l'aide d'une aiguille et d'une seringue stériles ; des précautions doivent être prises pour éviter la contamination de la solution. Chaque dose de vaccin doit être administrée avec une aiguille neuve.

Il faut éviter tout contact avec des désinfectants (voir rubrique « Précautions »).

Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

SCHÉMA DE VACCINATION

Priorix™ est indiqué pour l'immunisation active contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.

La posologie recommandée est une dose unique (0,5 ml) du vaccin reconstitué.

Dans les pays où l'incidence de rougeole et la mortalité due à la maladie sont élevées au cours de la première année de vie, l'âge recommandé pour la vaccination ROR est 9 mois (270 jours) ou peu après (voir également rubrique « Précautions »). Dans les pays où l'infection rougeoleuse survient plus tard dans la vie (en raison d'une couverture vaccinale élevée soutenue), la vaccination peut être effectuée à l'âge de 12-15 mois. Une seconde opportunité est nécessaire, à la fois pour augmenter la possibilité que tous les enfants reçoivent au moins une dose d'un vaccin contenant la valence rougeole et pour augmenter le pourcentage de la population totalement immunisée. La seconde dose du vaccin contenant la valence rougeole peut être administrée dans le cadre des vaccinations de routine ou en vaccination supplémentaire (voir également rubrique « Propriétés pharmacologiques »).

La sécurité et l'efficacité de ***Priorix™*** chez les nourrissons âgés de moins de 9 mois n'ont pas été établies.

Priorix™ peut être utilisé chez les personnes préalablement vaccinées à l'aide d'un autre vaccin monovalent ou combiné contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.

Utilisation avec d'autres vaccins

Les études cliniques ont démontré que ***Priorix™*** peut être administré simultanément avec n'importe lequel des vaccins monovalents ou combinés suivants (y compris les vaccins hexavalents [DTPa-HBV-IPV/Hib] : le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche acellulaire (DTCa), le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche acellulaire au contenu réduit en antigènes (dTpa), le vaccin contre *Haemophilus influenzae* de type b (Hib), le vaccin poliomyélitique inactivé (VPI), le vaccin contre l'hépatite B (VHB), le vaccin contre l'hépatite A (VHA), le vaccin méningococcique de sérogroupe B (MenB), le vaccin méningococcique conjugué de sérogroupe C (MenC), le vaccin méningococcique conjugué de sérogroupes A, C, W-135 et Y (MenACWY), le vaccin varicelle-zona (VZV), le vaccin poliomyélitique oral (VPO) et le vaccin pneumococcique conjugué 10-valent, conformément aux recommandations locales.

Compte tenu du risque accru de fièvre, de sensibilité au site d'injection, de modification des habitudes alimentaires et d'irritabilité lorsque ***Bexsero™*** était administré conjointement à un vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle (MMR-V), une vaccination séparée de ***Priorix™*** peut être envisagée lorsque cela est possible.

Il n'existe pas de données concernant l'administration de ***Priorix™*** avec tout autre vaccin.

Si ***Priorix™*** doit être administré au même moment qu'un autre vaccin injectable, les vaccins doivent toujours être administrés à des sites d'injection différents.

S'ils ne sont pas administrés en même temps, un intervalle d'au moins un mois est recommandé entre l'administration de ***Priorix™*** et d'autres vaccins vivants atténués.

Si un test tuberculinique doit être pratiqué, il doit être réalisé avant la vaccination ou en même temps que celle-ci car il a été rapporté que les vaccins combinés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole peuvent entraîner une diminution transitoire de la sensibilité cutanée à la tuberculine. Étant donné que cette anergie peut durer jusqu'à 6 semaines au maximum, le test tuberculinique ne doit pas être pratiqué au cours de cette période suivant la vaccination pour éviter des résultats faussement négatifs.

Chez les patients ayant reçu des gammaglobulines humaines ou une transfusion sanguine, la vaccination devra être différée de 3 mois ou plus (jusqu'à 11 mois) selon la dose d'immunoglobulines humaines administrée, en raison du risque d'échec vaccinal dû aux anticorps dirigés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole acquis de façon passive.

EFFETS INDÉSIRABLES

Résumé du profil de tolérance

Le profil de tolérance présenté ci-dessous est basé sur les données d'environ 12 000 sujets ayant reçu ***Priorix™*** dans les études cliniques.

Les effets indésirables susceptibles de se produire après l'utilisation d'un vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons et la rubéole correspondent à ceux observés après l'administration de vaccins monovalents seuls ou en association.

Dans les études cliniques contrôlées, les signes et symptômes ont été surveillés activement pendant une période de suivi de 42 jours. Il était également demandé aux sujets vaccinés de rapporter tous les événements cliniques survenant pendant la période d'étude.

Après l'administration de ***Priorix™***, les effets indésirables les plus fréquents étaient une rougeur au site d'injection et une fièvre ≥ 38° C (température rectale) ou ≥ 37,5° C (température axillaire/orale).

Tableau des effets indésirables

Les effets indésirables rapportés sont classés selon la fréquence suivante :

Très fréquent : (≥ 1/10)

Fréquent : (≥ 1/100 à < 1/10)

Peu fréquent : (≥ 1/1 000 à < 1/100)

Rare : (≥ 1/10 000 à < 1/1 000)

Données des études cliniques

Classe de système d'organe	Fréquence	Effets indésirables
Infections et infestations	Fréquent	infection respiratoire haute
	Peu fréquent	otite moyenne
Affections hématologiques et du système lymphatique	Peu fréquent	adénopathie
Affections du système immunitaire	Rare	réactions allergiques
Troubles du métabolisme et de la nutrition	Peu fréquent	anorexie
Affections psychiatriques	Peu fréquent	nervosité, pleurs anormaux, insomnie
Affections du système nerveux	Rare	convulsions fébriles
Affections oculaires	Peu fréquent	conjonctivite
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales	Peu fréquent	bronchite, toux
Affections gastro-intestinales	Peu fréquent	tuméfaction de la glande parotide, diarrhée, vomissements
Affections de la peau et du tissu sous-cutané	Fréquent	éruption cutanée
Troubles généraux et anomalies au site d'administration	Très fréquent	rougeur au site d'injection, fièvre ≥ 38°C (température rectale) ou ≥ 37,5°C (température axillaire/buccale)
	Fréquent	douleur et œdème au site d'injection, fièvre > 39,5°C (température rectale) ou > 39°C (température axillaire/buccale)

En général, la catégorie de fréquence des effets indésirables a été similaire avec la première et la seconde doses du vaccin. L'exception a été la douleur au site d'injection, qui a été « fréquente » après la première dose du vaccin et « très fréquente » après la seconde dose.

Données après la commercialisation

Les effets indésirables suivants ont été rapportés en de rares occasions dans le cadre de la vaccinovigilance après la mise sur le marché. Étant donné qu'il s'agit d'événements rapportés volontairement par une population de taille inconnue, il est impossible de fournir une estimation fiable de la fréquence.

Classe de système d'organe	Effets indésirables
Infections et infestations	méningite, syndrome semblable à la rougeole, syndrome semblable aux oreillons (y compris orchite, épididymite et parotidite)
Affections hématologiques et du système lymphatique	thrombopénie, purpura thrombopénique
Affections du système immunitaire	réactions anaphylactiques
Affections du système nerveux	encéphalite*, cérébellite, symptômes semblables à ceux d'une cérébellite (y compris troubles transitoires de la marche et ataxie transitoire), syndrome de Guillain-Barré, myélite transverse, névrite périphérique
Affections vasculaires	vascularite
Affections de la peau et du tissu sous-cutané	érythème polymorphe
Affections musculo-squelettiques et systémiques	arthralgies, arthrite

* Des cas d'encéphalite ont été rapportés à une fréquence inférieure à 1 pour 10 millions de doses. Le risque d'encéphalite après l'administration du vaccin est très inférieur au risque d'encéphalite causée par les maladies naturelles (rougeole : 1 sur 1 000 à 2 000 cas ; oreillons : 2 à 4 sur 1 000 cas ; rubéole : environ 1 sur 6 000 cas).

Une administration intravasculaire accidentelle peut entraîner des réactions sévères, voire un choc. Les mesures immédiates dépendent de la sévérité de la réaction (voir rubrique « Précautions »).

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique « Description » ou à la néomycine. Des antécédents de dermatite de contact due à la néomycine ne constituent pas une contre-indication. Concernant les réactions d'hypersensibilité aux protéines d'œufs, voir rubrique « Précautions ».

Immunodéficience humorale ou cellulaire sévère (primaire ou acquise), p. ex. immunodéficience sévère combinée, agammaglobulinémie et SIDA ou infection asymptomatique par le VIH, ou pourcentage de CD4+/lymphocytes-T spécifique à l'âge chez les enfants âgés de moins de 12 mois : CD4+ < 25 % ; enfants âgés entre 12 et 35 mois : CD4+ < 20 % ; enfants âgés entre 36 et 59 mois : CD4+ < 15 % (voir rubrique « Précautions »).

Grossesse. De plus, une grossesse doit être évitée pendant 1 mois après la vaccination (voir rubrique « Grossesse et allaitement »).

Comme pour les autres vaccins, l'administration de ***Priorix™*** doit être reportée chez les patients souffrant d'une maladie fébrile aiguë sévère. La présence d'une infection mineure, telle qu'un rhume, ne doit pas entraîner le report de la vaccination.

PRÉCAUTIONS

Comme avec tous les vaccins injectables, il est recommandé de toujours disposer d'un traitement médical approprié et d'assurer une surveillance pour le rare cas où surviendrait une réaction anaphylactique après l'administration du vaccin.

Avant d'injecter le vaccin, attendre que l'alcool et les autres agents désinfectants se soient évaporés de la peau car ils pourraient inactiver les virus atténués contenus dans le vaccin.

Les nourrissons âgés de moins de 12 mois peuvent ne pas présenter une réponse suffisante à la valence rougeole du vaccin en raison de la persistance possible d'anticorps maternels contre la rougeole. Cela ne doit pas empêcher l'utilisation du vaccin chez les jeunes enfants (moins de 12 mois) puisque la vaccination peut être indiquée dans certaines situations telles que les régions à haut risque. Dans ce cas, une nouvelle vaccination à partir de l'âge de 12 mois est nécessaire.

Il convient d'être très prudent lorsque l'on administre ***Priorix™*** à des personnes atteintes d'un trouble du système nerveux central (SNC), sujettes aux convulsions fébriles ou ayant des antécédents familiaux de convulsions. Les personnes vaccinées qui ont des antécédents de convulsions fébriles doivent faire l'objet d'un suivi étroit.

Les valences rougeole et oreillons du vaccin sont produites sur culture cellulaire d'embryon de poulet et peuvent donc contenir des traces de protéines d'œuf. Les sujets ayant des antécédents de réaction anaphylactique, anaphylactoïde ou d'autres réactions immédiates (par exemple urticaire généralisée, œdème bucco-pharyngé, difficultés respiratoires, hypotension ou choc) suite à l'ingestion d'œufs peuvent avoir un risque accru de réactions d'hypersensibilité immédiate après la vaccination, bien que ce type de réaction soit très rare. La plus grande prudence est recommandée pour la vaccination de sujets ayant présenté une anaphylaxie après l'ingestion d'œufs et il est recommandé de disposer d'un traitement approprié en cas de réaction anaphylactique.

La vaccination pratiquée jusqu'à 72 heures après l'exposition à la rougeole naturelle peut conférer une protection limitée contre la maladie.

Une syncope (évanouissement) peut se produire après, ou même avant, toute vaccination en réaction psychogène à l'injection avec aiguille, en particulier chez les adolescents. Cette réaction peut s'accompagner de plusieurs signes neurologiques, tels que des troubles transitoires de la vision, une paresthésie et des mouvements tonico-cloniques des membres pendant la récupération. Il est important de prévoir les procédures nécessaires pour éviter les blessures consécutives à une perte de connaissance.

Comme avec tout vaccin, une réponse immunitaire protectrice peut ne pas être obtenue chez toutes les personnes vaccinées.

Priorix™ ne doit en aucun cas être administré par voie intravasculaire.

Thrombopénie

Des cas d'aggravation et des cas de récurrence d'une thrombopénie chez des patients ayant présenté une thrombopénie après la première dose ont été rapportés après la vaccination avec des vaccins vivants rougeole-oreillons-rubéole. Une thrombopénie associée au vaccin rougeole-oreillons-rubéole est rare et elle se résorbe généralement d'elle-même. Chez les patients présentant une thrombopénie existante ou des antécédents de thrombopénie après une vaccination contre la rougeole, les oreillons ou la rubéole, la balance bénéfice-risque d'une administration de ***Priorix™*** doit être soigneusement évaluée. Ces patients doivent être vaccinés avec prudence et, de préférence, par voie sous-cutanée.

Patients immunodéprimés

La vaccination doit être envisagée chez les patients présentant certaines déficiences immunitaires, dans les cas où les avantages l'emportent sur les risques (notamment chez les patients présentant une infection asymptomatique par le VIH, des déficits en sous-classes des IgG, une neutropénie congénitale, une maladie granulomateuse chronique ou des maladies associées au déficit du complément).

Les patients immunodéprimés ne présentant pas de contre-indications à ce vaccin (voir rubrique « Contre-indications ») peuvent ne pas répondre aussi bien que les patients immunocompétents, il est donc possible qu'ils contractent la rougeole, les oreillons ou la rubéole par contact, malgré une vaccination adéquate. Ces patients doivent être attentivement suivis afin de déceler tout signe éventuel de rougeole, d'oreillons et de rubéole.

Transmission

La transmission à des contacts réceptifs du virus de la rougeole et des oreillons par des personnes ayant reçu le vaccin n'a jamais été documentée. On sait que l'excrétion pharyngée du virus de la rubéole et des oreillons se produit environ 7 à 28 jours après la vaccination, avec un pic d'excrétion aux alentours du 11e jour. Il n'existe toutefois aucune preuve de la transmission de l'excrétion de ces virus contenus dans le vaccin à des contacts réceptifs. La transmission du virus vaccinal de la rubéole à des nourrissons par le lait maternel, ainsi que la transmission par le placenta, a été documentée, mais sans aucune preuve de la maladie clinique.

Grossesse et allaitement

Fertilité

Priorix™ n'a pas été évalué dans des études de fertilité.

Grossesse

Les femmes enceintes ne doivent pas être vaccinées avec ***Priorix™***.

Aucune lésion n'a toutefois été documentée chez le fœtus lorsqu'un vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole a été administré à des femmes enceintes.

Même si le risque théorique ne peut être exclu à ce jour, aucun cas de syndrome de rubéole congénitale n'a été rapporté chez plus de 3 500 femmes réceptives, qui étaient sans le savoir en début de grossesse lors de l'administration d'un vaccin contre la rubéole. Dès lors, l'administration par inadvertance à des femmes ne se sachant pas enceintes d'un vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole ne doit pas constituer un motif d'interruption de grossesse.

Une grossesse doit être évitée pendant le mois qui suit la vaccination. Les femmes qui tentent de concevoir doivent être averties de ce délai.

Allaitement

L'expérience est limitée concernant ***Priorix™*** pendant l'allaitement. Des études ont montré que des femmes qui allaitent après l'accouchement et qui ont reçu un vaccin vivant atténué contre la rubéole peuvent sécréter le virus dans le lait maternel et le transmettre aux nourrissons allaités sans symptôme clinique apparent. Seulement dans le cas où il est confirmé ou suspecté que l'enfant est immunodéficient, le rapport bénéfice-risque de la vaccination de la mère doit être évalué (voir rubrique « Contre-indications »).

Effets sur l'aptitude à conduire et à utiliser des machines

Priorix™ n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire et à utiliser des machines.

Surdosage

Des cas de surdosage (jusqu'à 2 fois la dose recommandée) ont été rapportés dans le cadre de la vaccinovigilance. Aucun effet indésirable n'a été associé au surdosage.

Données de sécurité préclinique

Les données non cliniques issues des études conventionnelles de sécurité n'ont pas révélé de risque particulier pour l'homme.

Incompatibilités

En l'absence d'études de compatibilité, ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments.

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Pour cette rubrique, se reporter à la fiche OMS d'information à l'usage des prescripteurs sur le site Internet de l'OMS.

CONSERVATION

La date de péremption est indiquée sur l'étiquette et sur l'emballage.

À conserver et transporter réfrigéré (2°C – 8°C).

Ne pas congeler.

A conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière.

Conformément aux recommandations de l'OMS, une fois reconstitué, le vaccin doit être conservé à une température comprise entre +2°C et +8°C à l'abri des rayons solaires ; le flacon doit être éliminé à la fin de chaque session d'immunisation ou 6 heures après la reconstitution, selon la première occurrence.

PRÉSENTATION

Poudre contenue dans un flacon (verre de type I) pour 1 dose ou 2 doses, muni d'un bouchon en caoutchouc.

Solution contenue dans une ampoule (verre de type I) pour 1 dose (0,5 ml) ou 2 doses (1 ml).

Conditionnement de 100.

Pastille de contrôle du vaccin (voir le pictogramme de la PCV à la fin de la notice)

La pastille de contrôle du vaccin (PCV) fait partie du bouchon utilisé pour tous les lots de ***Priorix™*** fournis par GlaxoSmithKline Biologicals. Le point de couleur qui apparaît sur le bouchon du flacon est une PCV. C'est une pastille sensible à la température au cours du temps qui donne une indication de la chaleur cumulée à laquelle le flacon a été exposé. Elle avertit l'utilisateur final lorsque l'exposition à la chaleur peut avoir dégradé le vaccin au-delà d'un niveau acceptable.

L'interprétation de la PCV est simple. Vérifier le carré central. Sa couleur change progressivement. Tant que la couleur du carré est plus claire que celle de l'anneau, le vaccin peut être utilisé. Dès que le carré central est de la même couleur que l'anneau ou plus foncé que l'anneau, le flacon doit être éliminé.

Il est absolument essentiel de veiller à ce que les conditions de conservation indiquées ci-dessus (notamment la chaîne du froid) soient respectées. GlaxoSmithKline Biologicals n'assumera aucune responsabilité si ***Priorix™*** n'a pas été conservé conformément à ces instructions de conservation.

DESCRIÇÃO

Priorix™, pó e solvente para solução injetável

Vacina combinada contra sarampo, caxumba e rubéola (vírus vivo)

Após a reconstituição, 1 dose (0,5 ml) contém:

Vírus vivos atenuados do sarampo[1] (cepa Schwarz) não menos do que $10^{3,0}$ $CCID_{50}$[3]

Vírus vivos atenuados da caxumba[1] (cepa RIT 4385, derivada da cepa Jeryl Lynn) não menos do que $10^{3,7}$ $CCID_{50}$[3]

Vírus vivos atenuados de rubéola[2] (cepa Wistar RA 27/3) não menos do que $10^{3,0}$ $CCID_{50}$[3]

[1] produzidas em células de embrião de galinha

[2] produzidas em células diplóides humanas MRC-5

[3] dose infectante em cultura de células 50%

Excipientes:

Pó: aminoácido, lactose (anidra), manitol, sorbitol.

Solvente: água para injeção

Excipientes com efeito conhecido: a vacina contém 9 mg de sorbitol.

A neomicina está presente como resíduo proveniente do processo de fabricação (consulte a seção "Contraindicações").

ADMINISTRAÇÃO

A ***Priorix™*** deve ser administrada por via subcutânea, embora possa ser administrada por via intramuscular, na região deltoide ou na área anterolateral da coxa (consulte as seções "Programa de Vacinação" e "Precauções").

A vacina deve ser administrada de preferência por via subcutânea em pacientes com trombocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação (consulte a seção "Precauções").

O componente de sarampo-caxumba-rubéola liofilizado é um pó de coloração branca à rosa claro.

O solvente é uma solução transparente e incolor.

O solvente e a vacina reconstituída devem ser inspecionados visualmente antes da administração da injeção para verificação da existência de quaisquer partículas estranhas e/ou variação dos aspectos físicos. Se encontrados, o solvente ou a vacina reconstituída devem ser descartados.

A vacina deve ser reconstituída adicionando-se todo o conteúdo da ampola de solvente ao frasco contendo o pó. Após a adição do solvente ao pó, a mistura deve ser bem agitada, até que o pó esteja completamente dissolvido no solvente.

A vacina reconstituída pode variar na coloração, indo de laranja-claro a rosa-forte, devido à pequena variação de seu pH, sem perda da potência da vacina.

Após a reconstituição:

Embalagem de 1 dose:

Extraia todo o conteúdo do frasco e administre-o. Uma agulha nova deve ser usada para a aplicação da vacina.

Embalagem de 2 doses:

Quando utilizar um frasco de dose múltipla, cada dose de 0,5 ml deve ser retirada com uma agulha e seringa estéreis; devem ser tomadas precauções para evitar a contaminação do conteúdo. Uma nova agulha deve ser usada para administrar cada dose individual da vacina.

O contato com desinfetantes deve ser evitado (consulte a seção "Precauções").

Os produtos não utilizados ou os resíduos a serem descartados devem ser eliminados de acordo com as exigências do país.

PROGRAMA DE VACINAÇÃO

Priorix™ é indicada para a imunização ativa contra o sarampo, a caxumba e a rubéola.

Recomenda-se a administração de uma dose única (0,5 ml) da vacina reconstituída.

Em países onde a incidência e a mortalidade por sarampo são elevadas no primeiro ano de vida, a idade recomendada para imunização com a tríplice viral é de 9 meses de idade (270 dias) ou brevemente após (consulte também a seção "Precauções"). Em países onde a infecção por sarampo ocorre mais tarde na vida (devido à alta cobertura sustentada da vacina), a idade da imunização pode ser mudada para 12-15 meses. A segunda oportunidade é necessária tanto para aumentar a chance de que toda criança receba pelo menos uma dose da vacina contendo sarampo, como para aumentar a proporção da população que fica completamente imunizada. A segunda dose da vacina contendo sarampo pode ser aplicada durante a atividade de vacinação rotineira ou em atividades complementares (consulte também a seção "Propriedades farmacológicas").

A segurança e a eficácia da ***Priorix™*** em bebês com menos de 9 meses de idade não foram estabelecidas.

A ***Priorix™*** pode ser usada em indivíduos que já foram anteriormente vacinados com outra vacina monovalente ou associada com sarampo, caxumba e rubéola.

Utilização com outras vacinas

Estudos clínicos demonstraram que a ***Priorix™*** pode ser administrada com qualquer uma das vacinas monovalentes ou combinadas a seguir [incluindo vacinas hexavalentes (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DTPa), vacina contra difteria, tétano e coqueluche com conteúdo reduzido de antígenos (dTpa), vacina contra *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib), vacina inativada contra a poliomielite (IPV), vacina contra a hepatite B (HBV), vacina contra a hepatite A (HAV), vacina meningocócica sorogrupo B (MenB), vacina conjugada meningocócica sorogrupo C (MenC), vacina conjugada meningocócica sorogrupos A, C, W-135 e Y (MenACWY), vacina contra varicela-zoster (VZV), vacina oral contra a poliomielite (OPV) e vacina conjugada pneumocócica 10-valente de acordo com as recomendações locais.

Devido a aumento do risco de febre, sensibilidade no local da injeção, alterações nos hábitos alimentares e irritabilidade quando a vacina ***Bexsero™*** foi coadministrada com uma vacina combinada contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela (MMR-V), a vacinação separada com ***Priorix™*** pode ser considerada quando possível.

Não há dados que respaldem o uso da ***Priorix™*** com nenhuma outra vacina.

Caso a ***Priorix™*** precise ser administrada ao mesmo tempo que outra vacina injetável, as aplicações deverão ser realizadas, sempre, em locais de injeção diferentes.

Se não for administrada ao mesmo tempo, um intervalo de pelo menos um mês é recomendado entre a administração da ***Priorix™*** e outras vacinas vivas atenuadas.

Se for necessário realizar testes de tuberculina, estes devem ser feitos antes ou simultaneamente à vacinação, já que houve relatos de que vacinas combinadas contra o sarampo, caxumba e rubéola podem causar uma depressão temporária da sensibilidade superficial da tuberculina. Como esta anargia pode durar até no máximo 6 semanas, os testes de tuberculina não devem ser realizados dentro desse período de tempo após a vacinação, para evitar resultados falso-negativos.

Em indivíduos que receberam gamaglobulinas humanas ou uma transfusão de sangue, a vacinação deve ser adiada por três meses ou mais (até 11 meses) dependendo da dose de globulinas humanas administradas, já que existe a probabilidade de falha da vacina devido a anticorpos passivamente adquiridos contra sarampo, caxumba e rubéola.

REAÇÕES ADVERSAS

Resumo do perfil de segurança

O perfil de segurança apresentado abaixo é baseado em aproximadamente 12.000 indivíduos administrados com ***Priorix™*** em estudos clínicos.

Reações adversas que podem ocorrer após o uso de uma vacina combinada contra sarampo, caxumba, rubéola correspondem àquelas observadas após a administração isolada ou em combinação com vacinas monovalentes.

Em estudos clínicos controlados, os sinais e sintomas foram monitorados ativamente durante um período de acompanhamento de 42 dias. Os vacinados também foram solicitados a relatar quaisquer eventos clínicos durante o período de estudo.

As reações adversas mais comuns após a administração da ***Priorix™*** foram vermelhidão no local da injeção e febre ≥38 °C (retal) ou ≥37,5 °C (axilar/oral).

Lista tabulada de reações adversas

As reações adversas relatadas estão listadas de acordo com a frequência a seguir:

Muito comum: (≥1/10)

Comum: (≥1/100 a <1/10)

Incomum: (≥1/1.000 a <1/100)

Rara: (≥1/10.000 a <1/1.000)

Dados dos ensaios clínicos

Classe de sistema de órgãos	Frequência	Reações adversas
Infecções e infestações	Comum	Infecção do trato respiratório superior
	Incomum	Otite média
Distúrbios do sistema circulatório e linfático	Incomum	Linfadenopatia
Distúrbios no sistema imune	Rara	Reações alérgicas
Distúrbios metabólicos e nutricionais	Incomum	Anorexia
Distúrbios psiquiátricos	Incomum	Nervosismo, choro anormal, insônia
Distúrbios do sistema nervoso	Rara	Convulsões febris
Distúrbios oculares	Incomum	Conjuntivite
Distúrbios respiratórios, torácicos e do mediastino	Incomum	Bronquite, tosse
Distúrbios gastrointestinais	Incomum	Hipertrofia da glândula parótida, diarreia, vômitos
Distúrbios cutâneos e dos tecidos subcutâneos	Comum	Erupção cutânea
Distúrbios gerais e condições no local de administração	Muito comum	Vermelhidão no local da injeção, febre ≥ 38°C (retal) ou ≥ 37,5°C (axilar/oral)
	Comum	Dor e edema no local da injeção, febre > 39,5°C (retal) ou > 39°C (axilar/oral)

Em geral, a categoria de frequência de reações adversas foi semelhante para a primeira e segunda dose da vacina. A exceção foi dor no local da injeção, que foi classificada como "Comum" após a primeira vacina e como "Muito comum" após a segunda dose da vacina.

Dados pós-comercialização

Os eventos adversos a seguir foram identificados em raras ocasiões durante a vigilância pós-comercialização. Pelo fato de terem sido relatados voluntariamente por uma população de tamanho desconhecido, uma estimativa verdadeira da frequência não pode ser fornecida.

Classe de sistema de órgãos	Reações adversas
Infecções e infestações	Meningite, síndrome semelhante ao sarampo, síndrome semelhante à caxumba (incluindo orquite, epididimite e parotite)
Distúrbios do sistema circulatório e linfático	Trombocitopenia, púrpura trombocitopênica
Distúrbios no sistema imune	Reações anafiláticas
Distúrbios do sistema nervoso	Encefalite*, cerebelite, sintomas semelhantes à cerebelite (incluindo distúrbios da marcha transitórios e ataxia transitória), síndrome de Guillain-Barré, mielite transversa, neurite periférica
Distúrbios vasculares	Vasculite
Distúrbios cutâneos e dos tecidos subcutâneos	Eritema multiforme
Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo	Artralgia, artrite

* Encefalite tem sido registrada com frequência inferior a 1 em 10 milhões de doses. O risco de encefalite após a administração da vacina é muito inferior ao risco de encefalite causada por doenças naturais (sarampo: 1 em 1.000 a 2.000 casos; caxumba: 2-4 em 1000 casos; rubéola: aproximadamente 1 em 6.000 casos).

A administração intravascular acidental pode dar origem a reações graves ou mesmo causar choque. As medidas imediatas a serem adotadas dependem da gravidade da reação (consulte a seção "Precauções").

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer dos excipientes listados na seção "Descrição" ou à neomicina. Um histórico de dermatite de contato à neomicina não é uma contraindicação. Para reações de hipersensibilidade à proteína do ovo, consulte a seção "Precauções".

Imunodeficiência celular (primária ou adquirida) ou humoral grave, por exemplo, imunodeficiência grave combinada, agamaglobulinemia e AIDS ou infecção por HIV assintomática ou uma porcentagem de linfócitos T CD4+ específicos da idade em crianças abaixo de 12 meses: CD4+ <25%; crianças entre 12 e 35 meses: CD4+ <20%; crianças entre 36 e 59 meses: CD4+ <15% (consulte a seção "Precauções")

Gravidez. Além disso, a gravidez deve ser evitada por um mês após a vacinação (consulte a seção "Gravidez e lactação").

Tal como outras vacinas, a administração da ***Priorix™*** deve ser postergada em indivíduos que sofrem de doença febril grave e aguda. A presença de uma infecção leve, como resfriado, não deve resultar no adiamento da vacinação.

PRECAUÇÕES

Tal como todas as vacinas injetáveis, tratamento médico apropriado e supervisão devem sempre estar prontamente disponíveis caso ocorra um evento anafilático raro após a administração da vacina.

Deve-se permitir que o álcool e outros agentes desinfetantes usados na pele evaporem antes da aplicação da vacina, uma vez que podem inativar os vírus atenuados na vacina.

Bebês com idade inferior a 12 meses podem não responder adequadamente ao componente de sarampo da vacina, devido à possível persistência de anticorpos maternos ao sarampo. Isto não deve impedir o uso da vacina em bebês mais jovens (< 12 meses), já que a vacinação pode ser indicada em algumas situações tais como, áreas de alto risco. Nestas circunstâncias, uma nova vacinação aos 12 meses de idade ou mais é necessária.

Deve-se tomar a devida cautela na administração da ***Priorix™*** em indivíduos com distúrbio do Sistema Nervoso Central (SNC), susceptibilidade à convulsão febril ou histórico familiar de convulsões. Pessoas vacinadas com histórico de convulsões febris devem ser monitoradas com atenção.

Os componentes de sarampo e caxumba da vacina são produzidos em culturas de células de embrião de galinha e, portanto, podem conter traços de proteínas do ovo. Indivíduos com histórico de reações anafiláticas, anafilactóides ou outras reações imediatas (por exemplo, urticária generalizada, inchaço da boca e garganta, dificuldade respiratória, hipotensão ou choque) subsequentes à ingestão de ovos podem correr um risco aumentado de reações de hipersensibilidade imediata após a vacinação, embora estes tipos de reações demonstraram ser muito raros. Indivíduos com histórico de anafilaxia após a ingestão de ovos, devem ser vacinados com extrema cautela, e um tratamento adequado para anafilaxia deve estar à disposição no caso de uma reação.

Proteção limitada contra sarampo pode ser obtida por vacinação até 72 horas após a exposição ao sarampo natural.

Síncopes (desmaios) podem ocorrer depois, ou até mesmo antes, de qualquer vacinação, principalmente em adolescentes, como uma reação psicogênica à agulha das injeções. Isso pode ser acompanhado por vários sinais neurológicos como distúrbio visual transitório, parestesia e movimentos tônico-clônicos dos membros durante a recuperação. É importante a utilização de procedimentos para evitar lesões causadas por desmaios.

Tal como qualquer vacina, uma resposta imune protetora pode não ser obtida em todas as pessoas vacinadas.

A ***Priorix™*** não deve ser administrada, em circunstância alguma, por via intravascular.

Trombocitopenia

Foram registrados, após a vacinação de vírus vivo contra o sarampo, caxumba e rubéola, casos de agravamento da trombocitopenia e casos de recorrência da mesma em pacientes que sofreram trombocitopenia após a primeira dose. Trombocitopenia associada ao MMR é rara e geralmente autolimitante. Em pacientes com trombocitopenia existente ou histórico de trombocitopenia após vacinação contra sarampo, caxumba ou rubéola, o risco-benefício da administração da ***Priorix™*** deve ser cuidadosamente avaliado. Esses pacientes devem ser vacinados com cuidado e de preferência usando a via subcutânea.

Pacientes imunocomprometidos

A vacinação pode ser considerada em pacientes com deficiências imunes selecionadas em que os benefícios superam os riscos (por ex., indivíduos com HIV assintomático, deficiências da subclasse de IgG, neutropenia congênita, doença granulomatosa crônica e doenças de deficiências complementares).

Pacientes imunocomprometidos que não têm contraindicação para essa vacina (consulte a seção "Contraindicações") podem não ter a mesma resposta que indivíduos imunocompetentes, portanto alguns desses pacientes podem adquirir sarampo, caxumba ou rubéola em caso de contato, apesar da administração apropriada da vacina. Esses pacientes devem ser monitorados cuidadosamente em busca de sinais de sarampo, parotite e rubéola.

Transmissão

A transmissão do vírus do sarampo e da caxumba de vacinados para contatos susceptíveis nunca foi documentada. Sabe-se que a excreção faríngea do vírus do sarampo e da caxumba ocorre cerca de 7 a 28 dias após a vacinação com pico de excreção próximo ao 11° dia. Entretanto, não há evidência de transmissão desses vírus de vacina excretados para contatos susceptíveis. A transmissão do vírus da vacina contra rubéola para bebês pelo leite materno, bem como transmissão transplacentária, foi documentada sem nenhuma evidência da doença clínica.

Gravidez e aleitamento

Fertilidade

A ***Priorix™*** não foi avaliada em estudos de fertilidade.

Gravidez

Grávidas não devem ser vacinadas com ***Priorix™***.

No entanto, dano fetal não foi documentando quando vacinas contra sarampo, caxumba e rubéola foram administradas a grávidas.

Mesmo se um risco teórico não puder ser excluído, nenhum caso de síndrome de rubéola congênita foi relatado em mais de 3.500 mulheres susceptíveis que não tinham conhecimento nos primeiros estágios da gravidez quando vacinadas com rubéola contendo o vírus. No entanto, a vacinação sem advertência de mulheres sem conhecimento da gravidez com vacinas contendo sarampo, caxumba e rubéola não deve ser motivo para terminação de gravidez.

Gravidez deve ser evitada por um mês após a vacinação. Mulheres com intenção de engravidar devem ser aconselhadas a postergar o plano.

Amamentação

Há experiência limitada com ***Priorix™*** durante a amamentação. Estudos mostram que mulheres pós-parto em período de amamentação vacinadas com vacinas atenuadas contra rubéola podem secretar o vírus no leite e transmiti-lo aos bebês alimentados sem evidência de qualquer doença sintomática. Somente no caso da criança estar confirmada ou com suspeita de ser imunodeficiente, riscos e benefícios de vacinar a mãe devem ser avaliados (consulte a seção "Contraindicações").