

Туркменистан

Профиль страны по туберкулезу

Население 2017

5.8 миллион

Оценка бремени ТБ*, 2017	Число (тыс.)	Показатель (на 100 000 населения)
Смертность (за исключением ВИЧ+ТБ)	0.57 (0.5–0.65)	9.9 (8.6–11)
Смертность (ВИЧ+ТБ только)	0.027 (0.012–0.049)	0.47 (0.2–0.85)
Заболеваемость (в том числе ВИЧ+ТБ)	2.5 (1.9–3.1)	43 (33–54)
Заболеваемость (ВИЧ+ТБ только)	0.13 (0.061–0.23)	2.3 (1.1–4.1)
Заболеваемость (РУ-/МЛУ-ТБ)**	0.54 (0.37–0.73)	9.4 (6.5–13)

Расчетное заболеваемость ТБ по возрасту и полу (в тысячах)*, 2017	Показатель	
	0-14 года	> 14 года
Женщины	0.13 (0.13–0.14)	0.9 (0.77–1)
Мужчины	0.15 (0.14–0.16)	1.3 (1–1.5)
Всего	0.28 (0.26–0.31)	2.2 (1.7–2.7)

Регистрация случаев, 2017	
Общее число зарегистрированных случаев, всего	2 232
Новые случаи и рецидивы, всего	1 968
- % случаев протестированы быстрыми методами диагностики на момент постановки диагноза	76%
- % известным ВИЧ-статусом	
- % случаев ТБ с легочной локализацией	76%
- % бактериологически подтвержденного ТБ среди случаев с легочной локализацией	47%

Всеобщий охват услугами здравоохранения и социальной защитой	
Охват всех случаев ТБ (регистрация / расчетная заболеваемость), 2017	80% (63–100)

Больные стоящие перед затрами катастрофического влияние на личн:	
Коэффициент летальности ТБ (расчетная смертность / расчетную заболеваемость), 2017	0.25 (0.18–0.32)

Ведение ко-инфекции ТБ/ВИЧ среди новых случаев ТБ и рецидивов, 2017	
ВИЧ «+» случаи туберкулеза	Число (%)
- получающие курс АРТ	


Лечение и ведение ТБ с лекарственной устойчивостью, 2017			
	Новые случаи	Ранее леченные случаи	Общее число***
Расчетное число случаев с РУ-/МЛУ-ТБ среди всех зарегистрированных случаев ТБ			340 (290–390)
Расчетная доля случаев с РУ-/МЛУ-ТБ среди зарегистрированных случаев ТБ (%)	14% (11–18)	38% (31–46)	
Доля случаев ТБ тестированных на наличие рифампицин устойчивости (%)	58%		1 085
Число случаев РУ-/МЛУ-ТБ прошешите протестированы на устойчивость к лекарственным средствам второго ряда			
Лабораторно подтвержденные случаи		МЛУ/РУ-ТБ: 343, ШЛУ-ТБ: 6	
Пациенты начавшие лечение ****		МЛУ/РУ-ТБ: 343, ШЛУ-ТБ: 6	

Показатель успешности лечения и объём когорты		
	лешности	Когорта
Все новые и рецидивы, зарегистрированные в 2016	84%	2 068
Ранее пролеченных больных, за исключением рецидива, зарегистрированные в 2016	83%	272
Случаи ТБ с ВИЧ ко-инфекцией 2016		
МЛУ/РУ-ТБ случаи которые начали лечение препаратами второго ряда в 2015	68%	210
ШЛУ-ТБ случаи которые начали лечение препаратами второго ряда в 2015		

Профилактическое лечение ТБ, 2017	
% получающих ТБ профилактическую терапию из числа вновь включенных в программу помощи по ВИЧ-положительных	
% получающих ТБ профилактическую терапию их числа детей (в возрасте <5 лет) надодившиеся в бытовом контакте бактериологически подтвержденным больным ТБ	


Финансирование ТБ, 2018	
Бюджет программы борьбы с туберкулезом (Млн. долларов США)	

(Показатель на 100 000 населения в год)




Смертность (за исключением ВИЧ+ТБ)

(Показатель на 100 000 населения в год)



Заболеваемость
Зарегистрированных (новые и рецидивы)
Заболеваемость (ВИЧ+ТБ только)

Регистрация по полу и возрасту, 2017




Женщины Мужчины Заболеваемость

Показатель успешности лечения (%)



новые и рецидивы
Ранее лечение, без рецидивов
ВИЧ «+» МЛУ/РУ-ТБ ШЛУ-ТБ

Общий бюджет (Млн. долларов США)



Дефицит бюджета
Финансирование международными партнерами
Финансирование из Государственного бюджета

* Диапазоны указывают на интервалы неопределенности

** МЛУ-ТБ, это случаи ТБ с устойчивостью к рифампицину и изониазиду; РУ-ТБ, это ТБ с устойчивостью к рифампицину

*** В эти числа входят случаи с неизвестной историей предыдущего лечения ТБ

**** Включая пациентов, выявленных до 2017 г. Тех у которых диагноз не был подтвержден лабораторно