

# Украина

## Профиль страны по туберкулезу

Население 2016

44 миллион

Оценка бремени ТБ*, 2016	Число (тыс.)	Показатель (на 100 000 населения)
Смертность (за исключением ВИЧ+ТБ)	4.2 (4.2–4.3)	9.5 (9.4–9.6)
Смертность (ВИЧ+ТБ только)	2 (1.3–2.9)	4.6 (3–6.4)
Заболеваемость (в том числе ВИЧ+ТБ)	39 (25–55)	87 (56–124)
Заболеваемость (ВИЧ+ТБ только)	8.1 (5.2–12)	18 (12–26)
Заболеваемость (РУ-/МЛУ-ТБ)**	21 (16–26)	47 (37–58)

Расчетное заболеваемость ТБ по возрасту и полу (в тысячах)*, 2016	Показатель	
	0-14 года	> 14 года
Женщины	2 (1.2–2.8)	9.3 (5.6–13)
Мужчины	2.3 (1.4–3.2)	25 (15–35)
Всего	4.4 (2.7–6.1)	34 (21–48)

Регистрация случаев, 2016	
Общее число зарегистрированных случаев, всего	34 088
Новые случаи и рецидивы, всего	29 052
- % случаев протестированы быстрыми методами диагностики на момент постановки диагноза	
- % известным ВИЧ-статусом	97%
- % случаев ТБ с легочной локализацией	91%
- % бактериологически подтвержденного ТБ среди случаев с легочной локализацией	69%

Всеобщий охват услугами здравоохранения и социальной защитой	
Охват всех случаев ТБ (регистрация / расчетная заболеваемость), 2016	75% (53–120)
Больные стоящие перед затрами катастрофического влияние на личн:	
Коэффициент летальности ТБ (расчетная смертность / расчетную заболеваемость), 2016	0.17 (0.11–0.24)

Ведение ко-инфекции ТБ/ВИЧ среди новых случаев ТБ и рецидивов, 2016	
ВИЧ «+» случаи туберкулеза	5 832 21%
- получающие курс АРТ	3 945 68%


Лечение и ведение ТБ с лекарственной устойчивостью, 2016			
Новые случаи	Ранее леченные случаи	Общее число***	
Расчетное число случаев с РУ-/МЛУ-ТБ среди всех зарегистрированных случаев ТБ		10 000 (10 000–11 000)	
Расчетная доля случаев с РУ-/МЛУ-ТБ среди зарегистрированных случаев ТБ (%)	27% (26–27)	47% (46–48)	
Доля случаев ТБ протестированных на наличие рифампицин устойчивости (%)	59%	72%	21 637
Число случаев РУ-/МЛУ-ТБ протестированы на устойчивость к лекарственным средствам второго ряда		8 651	
Лабораторно подтвержденные случаи	МЛУ/РУ-ТБ: 8 651, ШЛУ-ТБ: 1 195		
Пациенты начавшие лечение ****	МЛУ/РУ-ТБ: 8 756, ШЛУ-ТБ: 1 429		

Показатель успешности лечения и объем когорты		
Успешности	Когорта	
Все новые и рецидивы, зарегистрированные в 2015	75%	23 892
Ранее пролеченных больных, за исключением рецидива, зарегистрированные в 2015	57%	3 656
Случаи ТБ с ВИЧ ко-инфекцией 2015	63%	4 597
МЛУ/РУ-ТБ случаи которые начали лечение препаратами второго ряда в 2014	46%	7 174
ШЛУ-ТБ случаи которые начали лечение препаратами второго ряда в 2014	25%	1 097

Профилактическое лечение ТБ, 2016	
% получающих ТБ профилактическую терапию из числа вновь включенных в программу помощи по ВИЧ-положительных	52%
% получающих ТБ профилактическую терапию их числа детей (в возрасте <5 лет) надодившиеся в бытовом контакте бактериологически подтвержденным больным ТБ	12% (11–14)


Финансирование ТБ, 2017	
Бюджет программы борьбы с туберкулезом (Млн. долларов США)	52
Источник финансирования: 71% государственного, 16% международными, 13% дефицит	

(Показатель на 100 000 населения в год)




Смертность (за исключением ВИЧ+ТБ)

(Показатель на 100 000 населения в год)




Заболеваемость  
Зарегистрированных (новые и рецидивы)  
Заболеваемость (ВИЧ+ТБ только)

Регистрация по полу и возрасту, 2016




Женщины Мужчины

Показатель успешности лечения (%)



новые и рецидивы  
Ранее лечение, без рецидивов  
ВИЧ «+» МЛУ/РУ-ТБ ШЛУ-ТБ

Общий бюджет (Млн. долларов США)



Дефицит бюджета  
Финансирование международными партнерами  
Финансирование из Государственного бюджета

\* Диапазоны указывают на интервалы неопределенности

\*\* МЛУ-ТБ, это случаи ТБ с устойчивостью к рифампицину и изониазиду; РУ-ТБ, это ТБ с устойчивостью к рифампицину

\*\*\* В их числе случаи с неизвестной историей предыдущего лечения ТБ

\*\*\*\* Включая пациентов выявленных до 2016 г. Тех у которых диагноз не был подтвержден лабораторно